

Janusz JURECZKA

PROFIL LITOSTRATYGRAFICZNY

W interwale głęb. 0,0–11,6 (11,6) nie wydzielono jednostek litostratygraficznych / *lithostratigraphic units not defined*

NEOGEN *NEOGENE*

Formacja skawińska *Skawina Formation*

11,60–33,60 (22,00)

W interwale głęb. 33,60–50,00 (16,40) nie wydzielono jednostek litostratygraficznych / *lithostratigraphic units not defined*

KARBON *CARBONIFEROUS*

Krakowska seria piaskowcowa *Cracow Silesian Sandstone Series*

50,00–1143,25 (1093,25)

Warstwy libiąskie *Libiąż Beds*

50,00–393,25 (343,25)

Warstwy łaziskie *Łaziska Beds*

393,25–1143,25 (750,00)

Seria mułowcowa *Mudstone Series*

1143,25–1431,25 (288,00)

Warstwy orzeskie s.s. + warstwy załęskie *Orzesze Beds s.s. + Załęże Beds*

1143,25–1431,25 (288,00)

Górnośląska seria piaskowcowa *Upper Silesian Sandstone Series*

1431,25–1455,30 (24,05)

Warstwy rudzkie s.s. *Ruda Beds s.s.*

1431,25–1455,30 (24,05)

Seria paraliczna *Paralic Series*

1455,30–2145,80 (690,50)

Warstwy grodzieckie *Grodziec Beds*

1455,30–1573,20 (117,90)

Warstwy florowskie *Flora Beds*

1573,20–2070,20 (497,00)

Warstwy sarnowskie *Sarnów Beds*

2070,20–2145,80 (75,60)

Warstwy malinowickie *Malinowice Beds*

2145,80–2254,30 (108,50)