

Jan MALEC, Andrzej ROMANEK, Mieczysław STUDENCKI, Zbigniew SZCZEPANIK (redakcja)

PROFIL LITOSTRATYGRAFICZNY

CZWARTORZĘD *QUATERNARY*

W interwale głębokości 0,0–4,0 (4,0) nie wydzielono jednostek litostratygraficznych *lithostratigraphic units not defined*

KARBON *CARBONIFEROUS*

Warstwy z Zaręb *Zaręby Beds*

4,0–81,0 (77,0)¹

Warstwy z Radlina *Radlin Beds*

81,0–106,6 (25,6)

DEWON *DEVONIAN*

Seria marglisto-wapienna *Marly-Calcareous complex*

106,6–176,2 (69,6)

Formacja dolomitów i wapieni stromatoroidowo-koralowcowych z Kowali
Kowala Dolomite and Limestone Formation

176,2–818,5 (642,3)

Warstwy sitkówczańskie górne *Upper Sitkówka Beds*

176,2–357,7 (181,5)

Warstwy sitkówczańskie dolne *Lower Sitkówka Beds*

357,7–818,5 (460,8)

Dolomity laminowane i detrytyczne *Detrital and Laminated Dolomites*

818,5–981,8 (163,3)

Dolomity zbioturbowane i dolomity z makrofauną *Bioturbated Dolomites and Dolimites with macrofauna*

981,8–1080,0 (98,2)

Warstwy z Winnej *Winna Beds*

1080,0–1146,4 (66,4)

¹ Głębokość i miąższość podano w metrach.

Warstwy z Haliszki *Haliszka Beds*

1146,4–1218,2 (71,8)

KAMBR *CAMBRIAN*

Formacja łupków z Kamieńca *Kamieniec Shale Formation*

1218,2–1358,7 (140,5)

Formacja piaskowców z Ociesęk *Ociesęki Sandstone Formation*

1358,7–1375,0 (miąższość pozorna 16,3)