

Jan MALEC, Zbigniew SZCZEPANIK (redakcja)

PROFIL CHRONOSTRATYGRAFICZNY

KENOZOIK *CENOZOIK*

CZWARTORZĘD *QUATERNARY*

0,0–4,0 m (4,0)¹

PALEOZOIK *PALEOZOIC*

4,0–1375,0 (1371,0)

KARBON *CARBONIFEROUS*

MISSISIP *MISSISSIPPIAN*

T U R N E J *T O U R N A I S I A N*

4,0–106,6 (102,6)

DEWON *DEVONIAN*

106,6–1218,2 (1111,6)

DEWON GÓRNY *UPPER DEVONIAN*

106,6–436,5 (329,9)

F A M E N *F A M E N N I A N*

106,6–176,2 (69,6)

F R A N *F R A S N I A N*

176,2–436,5 (260,3)

DEWON ŚRODKOWY *MIDDLE DEVONIAN*

436,5–1098,7 (662,2)

¹ Głębokość i miąższość podano w metrach.

Ż Y W E T *G I V E T I A N*

436,5–818,5 (382,0)

E I F E L *E I F E L I A N*

818,5–1098,7 (280,2)

DEWON DOLNY *LOWER DEVONIAN*

1098,7–1218,2 (119,5)

E M S *E M S I A N*

1098,7–1179,4 (80,7)

P R A G *P R A G I A N*

1179,4–1218,2 (38,8)

KAMBR *CAMBRIAN*

ODDZIAŁ 2 *SERIES 2*

P I Ę T R O 4 *S T A G E 4*

1218,2–1375,0 (156,8)