

Anna BECKER, Andrzej CHMIELEWSKI, Hubert KIERSNOWSKI, Sławomir OSZCZEPALSKI, Joanna RYCHEL,
Paweł URBAŃSKI, Ryszard WAGNER (zestawienie na podstawie GOSPODARCZYKA i in., 1979)

PROFIL CHRONOSTRATYGRAFICZNY

KENOZOIK *CENOZOIC*

0,0–191,0 (191,0)¹

CZWARTORZĘD *QUATERNARY*

0,0–43,0 (43,0)

NEOGEN *NEOGENE*

MIOCEN *MIOCENE*

43,0–133,0² (90,0)

PALEOGEN *PALEOGENE*

OLIGOCEN *OLIGOCENE*

133,0–191,0 (58,0)

MEZOZOIK *MESOZOIC*

191,0–1466,0 (>1275,0; nieprzewiercony)

TRIAS *TRIASSIC*

191,00–881,35 (690,35)

TRIAS ŚRODKOWY *MIDDLE TRIASSIC*

191,0–225,3 (34,3)

TRIAS DOLNY *LOWER TRIASSIC*

225,30–881,35 (656,05)

¹ Głębokości i miąższości podano w metrach.

² Podkreśleniem zaznaczono głębokości określone na podstawie rdzenia, pozostałe głębokości – według pomiarów geofizycznych.

PALEOZOIK *PALEOZOIC*

PERM *PERMIAN*

881,35–1466,00 (584,65; nieprzewiercony)