

Krzysztof LESZCZYŃSKI

PROFIL CHRONOSTRATYGRAFICZNY

KENOZOIK *CENOZOIC*

CZWARTORZĘD *QUATERNARY*

0,0–272,5 (272,5)¹

MEZOZOIK *MESOZOIC*

KREDA *CRETACEOUS*

272,5–2414,0 (2141,5)

KREDA GÓRNA *UPPER CRETACEOUS*

272,5–2061,5 (1789,0)

KAMPAN *CAMPANIAN*

272,5–7723,0 (450,5)

SANTON *SANTONIAN*

7723,0–11169,0 (446,0)

KONIAK–TURON *CONIACIAN–TURONIAN*

KONIAK GÓRNY–KONIAK ŚRODKOWY *UPPER CONIACIAN–MIDDLE CONIACIAN*

11169,0–14811,0 (312,0)

KONIAK DOLNY–TURON *LOWER CONIACIAN–TURONIAN*

14811,0–19560,0 (475,0)

CENOMAN *CENOMANIAN*

19560,0–2061,5 (105,5)

KREDA DOLNA *LOWER CRETACEOUS*

2061,5–2414,0 (352,5)

¹ Głębokość i miąższość podano w metrach.

ALB ALBIANALB GÓRNY *UPPER ALBIAN*

2061,5–?2115,0 (53,5)

ALB ŚRODKOWY–ALB DOLNY *MIDDLE ALBIAN–LOWER ALBIAN*

?2115,0–?2239,0 (124,0)

?APT ?APTIAN

?2239,0–?2270,0 (31,0)

?BARREM ?BARREMIAN

?2270,0–?2271,5 (1,5)

HOTERYW–WALANŻYN *HAUTERIVIAN–VALANGINIAN*

?2271,5–?2334,0 (62,5)

?HOTERYW GÓRNY ?UPPER HAUTERIVIAN

?2271,5–?2275,5 (4,0)

HOTERYW DOLNY–WALANŻYN GÓRNY *LOWER HAUTERIVIAN–UPPER VALANGINIAN*

?2275,5–?2291,0 (15,5)

WALANŻYN DOLNY *LOWER VALANGINIAN*

?2291,0–?2334,0 (43,0)

BERIAS *BERRIASIAN*

?2334,0–2414,0 (80,0)

BERIAS GÓRNY (RIAZAŃ) *UPPER BERRIASIAN (RYAZANIAN)*

?2334,0–?2347,5 (13,5)

BERIAS DOLNY *LOWER BERRIASIAN*

?2347,5–2414,0 (66,5)

JURA JURASSIC

2414,0–3652,0 (1238,0)

JURA GÓRNA *UPPER JURASSIC*

2414,0–3188,5 (774,5)

TYTON *TITHONIAN*

2414,0–2469,5 (55,5)

TYTON GÓRNY I ŚRODKOWY (CZĘŚĆ WYŻSZA) *UPPER AND MIDDLE (UPPER PART) TITHONIAN*

2414,0–2429,0 (15,0 m)

TYTON ŚRODKOWY (CZĘŚĆ NIŻSZA) I DOLNY *MIDDLE (LOWER PART) AND LOWER TITHONIAN*

2429,0–2469,5 (40,5 m)

KIMERYD *KIMMERIDGIAN*

2469,5–2675,5 (206,0)

KIMERYD GÓRNY *UPPER KIMMERIDGIAN*

2469,5–2554,5 (85,0)

KIMERYD DOLNY *LOWER KIMMERIDGIAN*

2554,5–2675,5 (121,0)

OKSFORD *OXFORDIAN*

2675,5–3188,5 (513,0)

JURA ŚRODKOWA *MIDDLE JURASSIC*

3188,5–3343,5 (155,0)

KELOWEJ *CALLOVIAN*

3188,5–3201,5 (13,0)

KELOWEJ GÓRNY I ŚRODKOWY *UPPER AND MIDDLE CALLOVIAN*

3188,25²–3188,40 (0,15)

KELOWEJ DOLNY *LOWER CALLOVIAN*

3188,4–3201,5 (13,1)

BATON *BATHONIAN*

3201,5–3315,0 (113,5)

BATON GÓRNY *UPPER BATHONIAN*

3201,5–3245,0 (43,5)

BATON ŚRODKOWY *MIDDLE BATHONIAN*

3245,0–3281,0 (36,0)

BATON DOLNY *LOWER BATHONIAN*

3281,0–3315,0 (34,0)

BAJOS *BAJOCIAN*

3315,0–3343,5 (28,5)

BAJOS GÓRNY *UPPER BAJOCIAN*

3315,0–3343,5 (28,5)

JURA DOLNA *LOWER JURASSIC*

3343,5–3652,0 (308,5)

TOARK *TOARCIAN*

3343,5–3457,5 (114,0)

TOARK GÓRNY *UPPER TOARCIAN*

3343,5–3367,0 (23,5)

² Głębokości podane według rdzenia zaznaczono podkreśleniem.

TOARK DOLNY *LOWER TOARCIAN*

3367,0–3457,5 (90,5)

PLIENSBACH–HETTANG *PLIENSBACHIAN–HETTANGIAN*

3457,5–3652,0 (194,0)

PLIENSBACH GÓRNY *UPPER PLIENSBACHIAN*

3457,5–3541,0 (83,5)

PLIENSBACH DOLNY–HETANG *LOWER PLIENSBACHIAN–HETTANGIAN*

3541,0–3652,0 (111,0)

TRIAS *TRIASSIC*

TRIAS GÓRNY *UPPER TRIASSIC*

3652,0–4730,0 (1078,0)

RETYK *RHAETIAN*

3652,0–3683,0 (31,0)

NORYK *NORIAN*

3683,0–?4044,0 (361,0)

KARNIK *CARNIAN*

?4044,0–4730,0 (686,0)