

Zbigniew CYMERMAN (zestawienie)

PROFILE LITOSTRATYGRAFICZNE

PROFIL LITOSTRATYGRAFICZNY OTWORU WIERTNICZEGO JEZIORO OKRĄGLE IG 1

W interwale głęb. 0,0–395,0 (395,0)¹ nie wydzielono jednostek litostratygraficznych *lithostratigraphic units not defined*

JURA *JURASSIC*

Formacja wapieni gąbkowych *Spongy Limestone Formation*

395,0–456,0 (61,0)

W interwale głęb. 456,0–529,0 (73,0) nie wydzielono jednostek litostratygraficznych *lithostratigraphic units not defined*

TRIAS *TRIASSIC*

Pstry piaskowiec *Buntsandstein*

529,0–725,0 (196,0)

Pstry piaskowiec środkowy *Middle Buntsandstein*

529,0–595,0 (66,0)

Formacja malborska *Malbork Formation*

529,0–554,0 (25,0)

Formacja lidzbarska *Lidzbark Formation*

554,0–595,0 (41,0)

Pstry piaskowiec dolny *Lower Buntsandstein*

Formacja bałtycka *Bałyk Formation*

595,0–725,0 (130,0)

PERM

Czerwony spągowiec *Rotliegend*

725,0–775,0 (50,0)

ORDOWIK *ORDOVICIAN*

Formacja pstrych wapieni z Kielna *Kielno variegated limestones Formation*

905,4–941,8 (36,4)

¹ Głębokość i miąższość podano w metrach.