

Janusz JURECZKA

## PROFILE CHRONOSTRATYGRAFICZNE

### OTWÓR WESOŁA PIG 1

#### KENOZOIK *CENOZOIC*

##### CZWARTORZĘD *QUATERNARY*

0,00–28,00 (28,00)<sup>1</sup>

#### PALEOZOIK *PALEOZOIC*

##### KARBON *CARBONIFEROUS*

28,00–1000,00 (972,00 nieprzewiercony)

##### PENSYLVAN *PENSYLVANIAN*

##### M O S K O W *M O S C O V I A N*

##### WESTFAL B *WESTPHALIAN B*

28,00–266,00 (238,00)

##### B A S Z K I R *B A S H K I R I A N*

266,00–977,10 (711,10)

##### WESTFAL A *WESTPHALIAN A*

266,00–801,86 (535,86)

##### NAMUR C *NAMURIAN C*

801,86–962,05 (160,19)

##### NAMUR B *NAMURIAN B*

962,05–977,10 (15,05)

---

<sup>1</sup> Głębokość i miąższość podano w metrach.

MISSISIP *MISSISSIPPIAN*

S E R P U C H O W *S E R P U K H O V I A N*

NAMUR A *NAMURIAN A*

977,10–1000,00 (22,90 nieprzewiercony)

## OTWÓR WESOŁA PIG 2H

**KENOZOIK *CENOZOIC***

**CZWARTORZĘD *QUATERNARY***

0,00–23,00 (23,00)<sup>2</sup>

**NEOGEN *NEOGENE***

23,00–51,00 (28,00)

**MIOCEN *MIOCENE***

M I O C E N   Ś R O D K O W Y   *M I D D L E   M I O C E N E*

**BADEN *BADENIAN***

23,00–51,00 (28,00)

**PALEOZOIK *PALEOZOIC***

**KARBON *CARBONIFEROUS***

51,00–1918,00 (1867,00)

**PENSYLVAN *PENSYLVANIAN***

51,00–1154,00 (1103,00)

**M O S K O W   *M O S C O V I A N***

**WESTFAL B *WESTPHALIAN B***

51,00–460,00 (409,00)

**B A S Z K I R   *B A S H K I R I A N***

460,00–1154,00 (694,00)

**WESTFAL A *WESTPHALIAN A***

460,00–911,00 (451,00)

**NAMUR C *NAMURIAN C***

911,00–1154,00 (243,00)

---

<sup>2</sup> Głębokości po długości otworu – MD.

MISSISIP *MISSISSIPPIAN*

S E R P U C H O W *S E R P U K H O V I A N*

NAMUR A *NAMURIAN A*

1154,00–1320,00 (166,00)

PENSYLWAN *PENSYLVANIAN*

B A S Z K I R *B A S H K I R I A N*

NAMUR B *NAMURIAN B*

1320,00<sup>3</sup>–1918,00 (598,00)

---

<sup>3</sup> Głębokość całkowitego wejścia osi wiercenia w pokład 510, kontakt z pokładem 510 na głębokości 1318 m MD.