

Lidia ADACH, Anna BECKER, Maria FRYDRYCHEWICZ, Jacek KASIŃSKI, Hubert KIERSNOWSKI,
Ewa ODRZYWOLSKA-BIEŃKOWA, Sławomir OSZCZEPALSKI, Hanna SENKOWICZOWA, Olga STYK, Ryszard WAGNER

PROFIL CHRONOSTRATYGRAFICZNY

KENOZOIK *CENOZOIC*

0,0–286,0 (286,0)

CZWARTORZĘD *QUATERNARY*

0,0–7,1 (7,1)¹

NEOGEN *NEOGENE*

MIOCEN *MIOCENE*

7,1–244,5 (237,4)²

PALEOGEN *PALEOGENE*

OLIGOCEN *OLIGOCENE*

244,5–286,0 (41,5)

MEZOZOIK *MESOZOIC*

TRIAS *TRIASSIC*

286,0–1194,0 (908,0)

TRIAS ŚRODKOWY *MIDDLE TRIASSIC*

286,0–484,5 (198,5)

TRIAS DOLNY *LOWER TRIASSIC*

484,5–1194,0 (709,5)

PALEOZOIK *PALEOZOIC*

PERM *PERMIAN*

1194,0–1630,00 (436,00)

¹ Głębokości i miąższości podano w metrach.

² Podkreśleniem zaznaczono głębokości określone na podstawie rdzenia, pozostałe głębokości – według pomiarów geofizycznych.

PERM GÓRNY *UPPER PERMIAN*WUCHIAPING-CHANGHSING *WUCHAPINGIAN-CHANGHSINGIAN*1194,0-1626,13 (432,13)PERM ŚRODKOWY *MIDDLE PERMIAN*WORD-KAPITAN *WORDIAN-CAPITANIAN*1626,13-1630,00 (3,87 nieprzewiercony)