

Anna FELDMAN-OLSZEWSKA

PROFIL STRATYGRAFICZNY

Czwartorzęd

PLEJSTOCEN *PLEISTOCENE*

0,0–52,0 (52,0)¹

NEOGEN *NEOGENE*

MIOCEN *MIOCENE*

MIOCEN DOLNY *LOWER MIOCENE*

52,0–78,0 (26,0)

Formacja adamowska *Adamów Formation* 52,0–78,0 (26,0)

PALEOGEN *PALEOGENE*

OLIGOCEN *OLIGOCENE*

OLIGOCEN DOLNY (RUPEL) *LOWER OLIGOCENE (RUPELIAN)*

78,0–88,0 (10,0)

Formacja czempińska *Czempin Formation* 78,0–88,0 (10,0)

KREDA *CRETACEOUS*

KREDA DOLNA *LOWER CRETACEOUS*

BERIAS *BERIASSIAN*

88,0–315,0 (227,0)

BERIAS ŚRODKOWY I GÓRNY (RIAZAŃ) *MIDDLE AND UPPER BERIASSIAN (RYAZANIAN)*

88,0–179,0 (91,0)

Formacja rogoźniańska *Rogoźno Formation* 88,0–169,5 (81,5)

Ogniwo zakrzewskie *Zakrzew Member* 88,0–132,0 (44,0)

Ogniwo kajetanowskie *Kajetanowo Member* 132,0–169,5 (37,5)

Formacja kcyńska (VII), pars *Kcynia Formation (VII), pars* 169,5–179,0 (9,5)

¹ Głębokość i miąższość podano w metrach

BERIAS DOLNY (WOŁG GÓRNY) *LOWER BERIASSIAN (UPPER VOLGIAN)*

179,0–315,0 (136,0)

Formacja keyńska (VII), pars Kcynia Formation (VII), pars 179,0–315,0 (136,0)

Ogniwo skotnickie, pars Skotniki Member, pars 179,0–230,5 (51,5)

Ogniwo z Wieńca Wieniec Member 230,5–293,0 (62,5)

Ogniwo wapieni korbulowych, pars Corbula Limestones Member, pars 293,0–315,0 (22,0)

JURA JURASSIC

315,0–1981,0 (1666,0)

JURA GÓRNA *UPPER JURASSIC*

315,0–1116,5 (801,5)

TYTON *TITHONIAN*

315,0–447,5 (132,5)

Formacja keyńska (VII), pars Kcynia Formation (VII), pars 315,0–330,0 (15,0)

Ogniwo wapieni korbulowych, pars Corbula Limestones Member, pars 315,0–330,0 (15,0)

Formacja pałucka (VI), pars Pałuki Formation (VI), pars 330,0–447,5 (117,5)KIMERYD *KIMMERIDGIAN*

447,5–695,0 (247,5)

KIMERYD GÓRNY *UPPER KIMMERIDGIAN*

447,5–654,0 (206,5)

Formacja pałucka (VI), pars Pałuki Formation (VI), pars 447,5–654,0 (206,5)KIMERYD DOLNY *LOWER KIMMERIDGIAN*

654,0–695,0 (41,0)

Formacja wapienno-marglisto-muszlówkowa (V) Calcareous-Marly-Coquina Formation (V)OKSFORD *OXFORDIAN*

695,0–1116,5 (421,5)

Grupa wapienna A Limestone Group A 695,0–1116,5 (421,5)**JURA ŚRODKOWA MIDDLE JURASSIC**

1116,5–1981,0 (864,5)

KELOWEJ *CALLOVIAN*

1116,5–1132,5 (16,0)

BATON *BATHONIAN*

1132,5–1442,0 (309,5)

BATON GÓRNY *UPPER BATHONIAN*

1132,5–1231,0 (98,5)

BATON ŚRODKOWY *MIDDLE BATHONIAN*

1231,0–1311,0 (80,0)

BATON DOLNY *LOWER BATHONIAN*

1311,0–1442,0 (131,0)

BAJOS *BAJOCIAN*

1442,0–?1790,0 (348,0)

BAJOS GÓRNY *UPPER BAJOCIAN*

1442,0–1686,0 (244,0)

BAJOS DOLNY *LOWER BAJOCIAN*

1686,0–?1790,0 (104,0)

AALEN *AALENIAN*

?1790,0–1981,0 m (191,0)

AALEN GÓRNY *UPPER AALENIAN*

?1790,0–1932,0 (142,0)

AALEN ?DOLNY *?LOWER AALENIAN*

1932,0–1981,0 (49,0)